




## Wat ging er goed

- > Keuze uit 4 rassen met advies per regio
- > Rhizobium enting goed aangeslagen
- > Op advies geen N meer toegediend
- > Uitbreiding in areaal
- > Drukbezochte informatie/veld bijeenkomsten
- > Gemiddeld grotere percelen
- > Mooie spreiding over het land
- > Ras- en Coatingproeven uitgevoerd op 3 locaties
- > Hogere topopbrengsten
- > Hoger eiwitgehalte
- > Logistiek goed verlopen
- > Veel publiciteit in vak- en consumentenmedia

# Het seizoen in beeld





# Resultaten 2017



## Variatie in opbrengstcijfers

- > Bruto opbrengst variërend van 1.473 kg tot 5.168 kg per hectare
- > Vochtpercentage variërend van 14,9% tot 45,0%
- > Netto opbrengst bij 15% vocht variërend van 687 kg tot 4.213 kg per hectare
- > Eiwitpercentage variërend van 36,6% tot 45,0% (N\_625)



# Resultaten in de tijd

Jaar	Hectare	Aantal telers	Opbrengst droge bonen/ha	Beste 25%	Eiwitgehalte	Poolprijs droge bonen
2013	30	9	2800			600,00
2014	90	30	2900	3400	38,5	512,50
2015	170	50	2500	3200	39,5	502,50
2016	80	24	2700	3600	39,1	501,50
<b>2017</b>	<b>400</b>	<b>70</b>	<b>3000</b>	<b>3800</b>	<b>41,6</b>	
Gemiddeld			2.800	3.600	40,5	

# Vooruitblik 2018

- > Proeven mbt sclerotiniagevoeligheid
- > Proeven mbt biologische teelt
- > Ras proeven mbt vroegrijpheid
- > Stimuleringsregelen met meer provincies
- > Focus op uitbreiding in Zuid-Nederland
- > Onderzoek naar eisen verwerkers
- > Concept voor melkveehouders/loonwerkers
- > Uitgebreide teelthandleiding beschikbaar

