



BIJVOET

ARTEMISIA VULGARIS

Plantenfamilie	
Asteraceae	
Oorsprong	
Azië	
Plantkenmerken	
Levensduur	meerjarig
Bloei	De meeste Bijvoet bloeit in juli. Maar er zijn ook soorten die in september bloeien. De bloemen zijn klein en zitten kort bij elkaar. Ze zijn wit van kleur.
Zaad	Fijnzadig
Blad	Licht behaarde bladeren, bovenkant donkergroen, onderkant viltig wit. De bladeren zijn veervormig en vormen samen een lancet.
Wortel	stokvormig
Groeihoogte	60cm tot 120cm
Voortplanting	Generatief + vegetatief
Teeltkenmerken	
Standplaats	zonnig
Bemesting	Bijvoet heeft weinig tot geen bemesting nodig als deze op rijkere gronden wordt geteeld.
Bodem	Bijvoet groeit het beste op wat rijkere gronden. Daarnaast houdt het van een zonnige en warme plek.
Zaaien en planten	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Zaaiperiode: Het zaad kan zowel eerst onder glas worden opgekweekt en dan in april/juni worden uitgeplant. Maar het kan ook makkelijk worden gezaaid in de vollegrond in de maand april tot juni. ▪ Zaaidiepte: ondiep zaaien ▪ Plantafstand: 40 x 40cm
Oogst	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Oogsttijd: In de maand juli kunnen de eerste planten al geoogst worden. Men plukt de beste blaadjes net voor de bloei. ▪ Oogstmethode: De opbrengst voor bijvoet gaat om de blaadjes van de plant. Daarom kan de bijvoet geoogst worden met de hand.
Opbrengst	Tot 2000kg gewas/ha
Ziekten en plagen	Geen
Onkruid	Handmatig wordt er onkruid bestreden
Potentiële toepassingen	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Medicinale toepassing ▪ Toepassing in Biologische gewasbescherming voor schimmelbestrijding. Echter heeft deze geen toelating. 	